

جدول التطعيمات الأساسية بدولة الكويت وفقاً للقرار الوزاري رقم (75) لسنة 2008

طريقة الإستخدام	نوع التطعيم	العمر عند التطعيم
الحقن بالعضل بالكتف	2 جرعة من توكسيد التيتانوس بالشهر الخامس والسابع من الحمل الأول 1 جرعة من توكسيد التيتانوس عند كل حمل قادم	الأم الحامل عند الشهر الخامس من الحمل الأول قادم
الحقن بالعضل في الفخذ	جرعة أولي من طعم الإلتهاب الكبدي باليوم الأول من ولادة الطفل	
الحقن بالعضل بالفخذ الحقن بالعضل بالفخذ الحقن بالعضل بالفخذ الآخر	جرعة واحدة من شلل الأطفال بالحقن (IPV) جرعة أولي من الطعم الخماسي * جرعة أولي من طعم النيموكوكال	عند تمام الشهر الثاني من العمر
الحقن داخل الجلد أعلى الكتف	تطعيم ضد الدرن (بي سي جي)	نهاية الشهر الثالث من العمر
نقط بالفم الحقن بالعضل الحقن بالعضل بالفخذ الآخر	جرعة أولي من شلل الأطفال الفموي (نمط (3.2.1) جرعة ثانية من الطعم الخماسي جرعة ثانية من طعم النيموكوكال	عند تمام الشهر الرابع
نقط بالفم الحقن بالعضل الحقن بالعضل بالفخذ الآخر	جرعة ثانية من شلل الأطفال الفموي (نمط (3.2.1) جرعة ثلاثة من الطعم الخماسي جرعة ثلاثة من طعم النيموكوكال	عند تمام الشهر السادس
الحقن تحت الجلد بأعلى الذراع نقط بالفم	الجرعة الأولى من طعم الحصبة/الحصبة الألمانية/النكاف جرعة ثلاثة من شلل الأطفال الفموي (نمط (3.2.1)	عند تمام العام الأول من العمر
نقط بالفم الحقن بالعضل الحقن بالعضل بالفخذ الآخر	جرعة منشطة من شلل الأطفال(نمط 3.2.1) جرعة منشطة من الطعم الخماسي جرعة منشطة من طعم النيموكوكال	عند تمام الشهر الثامن عشر
الحقن تحت الجلد الحقن تحت الجلد بأعلى الذراع	إلتهاب السحايا المينجوكوك الرباعي الجرعة الثانية من طعم الحصبة/الحصبة الألمانية/النكاف	عند تمام العام الثاني من العمر
نقط بالفم الحقن بالعضل	جرعة منشطة من شلل الأطفال (نمط 3.2.1) جرعة من الطعم الثلاثي (دفتيريا/ تيتانوس/ سعال ديجي)	عند عمر الثلاث سنوات ونصف
الحقن تحت الجلد الحقن بالعضل	جرعة منشطة الحصبة/الحصبة الألمانية/ الصف السادس (10 - 12 عام) النكاف (إناث) طعم الدفتيريا والتيتانوس (إناث وذكور)	
الحقن بالعضل	الصف الرابع الثانوي (16 - 18 عام) طعم الدفتيريا والتيتانوس	

* التطعيم الخماسي يحتوي على التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي والسحايا الهموفيليس والإلتهاب

الكبدى الفيروسي (ب)